

Fiche d'identité
de Zorvec® Vinabel®

	Zorvec® Vinabel®
AMM	2250421
Composition	Zorvec® active 40 g/L (oxathiapiproline) + Zoxamide 300 g/L
Formulation	SE (Suspo Emulsion)
Classement	H317, H410
Nombre d'applications	2 applications maximum/an ⁽¹⁾
Intervalle de traitement	14 jours maximum ⁽²⁾
ZNT aquatique et DVP	Applications entre les stades BBCH 15 et 19 : ZNT 20 mètres (dont DVP 5 mètres) Applications entre BBCH 50 et 79 : ZNT 20 mètres (dont DVP 20 mètres)
DSPPR	10 mètres
DRE	48 heures
DAR	28 jours
Conditionnements	• 1 seul bidon de 0,5 L pour 1 ha • 1 seul bidon de 2 L pour 4 ha

(1) 2 applications possibles en situation saine (10-14 jours)
(2) Réduire l'intervalle en fonction du risque mildiou, de la pluviométrie et des conditions de pousse (14 jours maximum)

Utilisations

Culture	Vigne : raisin de cuve et raisin de table (ne pas appliquer sur pépinières viticoles)
Cible	Mildiou
Dose	0,5 L/ha de Zorvec® Vinabel®
Stades d'application	1 à 2 applications préventives en encadrement de la période de floraison (idéalement dès BBCH 57 : les fleurs se séparent). Si risque précoce, intervenir dès BBCH 53 (inflorescences nettement visibles).
Préparation	Bien agiter avant emploi Voir étiquette

Zorvec® Vinabel® : Attention. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P261 Éviter de respirer les brouillards, vapeurs ou les aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P391 Recueillir le produit répandu. EUH401 - Respecter les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Zorvec® Vinabel® : SE - Suspo-émulsion, contenant 40 g/L d'oxathiapiproline et 300 g/L de zoxamide. AMM n°2250421 - Corteva Agriscience France S.A.S.
Responsable de la mise en marché : Corteva Agriscience France S.A.S. 3 Rond-Point des Saules - Immeuble La Renaissance - 78280 Guyancourt. N° d'agrément 7800030 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
 0 800 470 810 ©TM Marques déposées.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette des produits et/ou sur www.phytostimdata.com.

À VOTRE ÉCOUTE
0 800 470 810
 corteva.fr



Visitez www.corteva.fr
TM & Marques déposées de Corteva Agriscience et de ses sociétés affiliées © 2025 Corteva

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Zorvec® Vinabel®
FONGICIDE

Et si vous choisissiez
la sérénité ?

Zorvec® à la fleur : Ça change tout contre le mildiou !



Visitez www.corteva.fr
TM & Marques déposées de Corteva Agriscience et de ses sociétés affiliées © 2025 Corteva

Zorvec® Vinabel® : La puissance d'une protection anti-mildiou. La sérénité d'une récolte maîtrisée.

Zorvec® Vinabel® apporte :



Une protection totale de la vigne

En encadrement de la floraison, Zorvec® Vinabel® protège efficacement votre vigne contre le mildiou, même les feuilles et grappes qui ne sont pas totalement développées.



Une vendange préservée

L'efficacité spectaculaire de Zorvec® Vinabel® vous assure une sérénité accrue en sécurisant ainsi votre vendange.



Une organisation des travaux facilitée

En apportant une excellente résistance au lessivage et une grande souplesse d'utilisation, Zorvec® Vinabel® permet d'organiser de manière plus flexible vos interventions dans les vignes.




Le partenaire de votre avenir

Le mode d'action unique de Zorvec® Vinabel® contribue à une gestion des résistances efficace et pérenne, pour une protection anti-mildiou à long terme.



Bon à savoir

Gain de rendement obtenu pour un programme de protection incluant Zorvec® Vinabel®



- ① Zorvec® Vinabel® préserve la floraison et l'incidence directe du rot gris sur inflorescence = **impact quantitatif**
- ② Dans ces 5 essais menés en conditions extrêmes en 2021, Zorvec® Vinabel® a sécurisé un rendement entre 5 et 30 Hl/ha

Appliqué au stade fleurs séparées, Zorvec® Vinabel® sécurise votre rendement.

Les caractéristiques de Zorvec® Vinabel®

- ✓ La puissance de Zorvec® active désormais associée dans une seule formulation
- ✓ Très haut niveau d'efficacité contre le mildiou

Essai Mildiou 2023 sur Merlot - Le Tourne (33)

Témoin non traité (96,7 % de fréquence d'attaque, 45,4% d'intensité d'attaque)




Zorvec® Vinabel® : 2 applications en encadrement de floraison



- ① Haut niveau de protection feuilles et grappes
- ② Application uniquement préventive
- ③ 1 à 2 applications/ha/an
- ④ Durée de protection 14 jours maximum à réduire en fonction du risque mildiou, de la pluviométrie et des conditions de pousse
- ⑤ Facilitateur d'intégration de solutions biocontrôles en postfloraison

- ✓ Une excellente **résistance au lessivage** : dès 20 minutes après application
- ✓ Une **complémentarité d'action** : préventif, translaminaire, mouvement acropétale protégeant les organes néoformés
- ✓ Une **association unique de Zorvec® active** et de Zoxamide présentant 2 modes d'actions distincts sans résistance croisée
- ✓ Une **utilisation simplifiée** : 1 seul bidon à manipuler, une dose pratique de 0,5 L/ha et des conditionnements adaptés
- ✓ Un **partenaire d'avenir** : Zorvec® Vinabel® facilite l'intégration de solutions biocontrôles en post floraison

Positionnement technique



Appliquer Zorvec® Vinabel® lorsque le mildiou est le plus dommageable pour la vigne : **en encadrement de la période de floraison** (idéalement dès BBCH 57 : les fleurs se séparent). En cas de risque de contaminations précoces, il est possible d'intervenir dès le stade BBCH 53 (inflorescences nettement visibles) Zorvec® Vinabel® doit dans tous les cas être intégré dans un programme anti-mildiou robuste afin d'intervenir en préventif et avant l'apparition des premières tâches de mildiou.